



減重藥物比較簡表

時機 BMI>30或BMI>27合併有相關疾病者

| 名稱 |  |  |  |
|------|---|---|---|
| | 羅氏鮮 | 善纖達 | 胰妥讚 |
| 主要效果 | -30% 油脂吸收 亦影響脂溶性 維生素吸收 | 1.延緩胃排空 2.產生飽足感 3.抑制食慾 每日注射1次 | 1.延緩胃排空 2.產生飽足感 3.抑制食慾 每週注射1次 |
| 副作用 | 油便、排便 次數增加 | 噁心、腹瀉 便秘、嘔吐 頭痛 | 噁心、腹瀉 便秘、嘔吐 |

【藥物減重效果好嗎？3種藥物一次看】

想用藥物減重怎麼做？價格是多少？填免費諮詢單，讓我們完整告訴你
飲食調整和運動3~6個月仍未達標，

可加上這些減重藥物、內視鏡減重、外科減重手術治療

■ Orlistat (XENICAL® #羅氏鮮)

1999年通過FDA認證、2000年台灣食藥署核准上市，是一種#胰脂酶抑制劑 抑制胰脂酶在腸道分解食物中的油脂，直接排出體外（每餐油脂量約-30%）同時也會影響脂溶性營養素的吸收，如維生素A、D、E、K、胡蘿蔔素等。

■ Liraglutide (Saxenda®, 善纖達)

活化胰臟β細胞、刺激胰島素分泌（降低飯後血糖）最初作為糖尿病控制的藥物，因同時也能#抑制胰臟α細胞分泌昇糖素 進而延緩胃排空、產生飽足感並抑制食慾

■ Semaglutide (Ozempic®, 胰妥讚)

2017年通過FDA認證的治療第二型糖尿病的藥物，與上述Liraglutide一樣屬於GLP-1受體促效劑，其控糖及減重效果皆優於其他GLP-1藥物；但是目前在台灣使用此藥的適應症仍為#第二病糖尿病，因此若使用於非糖尿病的肥胖患者出現嚴重副作用，將無法取得藥害救濟。因此使用藥物減重，務必要透過醫師診斷哦！請勿使用非法藥物進行減重

（此圖為比較簡表，參閱：義大醫訊減重專刊 p. 36義大醫院家庭暨社區醫學部鄭璋霖醫師）

義大減重LINE@



義大減重FB臉書粉絲專頁



義大減重官方網站

