

義大醫療體系

福爾S10 POCT血糖機 教育訓練

遠宏醫療儀器股份有限公司



教育訓練流程

- 20min 儀器使用與作業流程
- 20min 問題討論與實機演練





大綱

- [1] 新舊血糖機比較及使用時機
- [2] Fora S10 血糖機簡介
- [3] 如何量測血糖
- [4] 如何執行品管
- [5] 如何使用緊急模式
- [6] 資料上傳(資料同步)
- [7] 血糖機錯誤排除
- [8] 設備維護



[1]新舊血糖機比較

		S10 傳輸型血糖機	GD40傳統型血糖機
- 人員	認證	使用人员必须经遇認證才可操 作血糖機	無強制認證
條碼	掃描	每次量測都需要掃描條碼 (緊急模式可不掃條碼)	不須掃描條碼
血糖	結果紀錄	不需要抄寫血糖量測結果可傳 至NIS系統	需要抄寫血糖值並轉錄到NIS系統
試片	碼	使用試片不需要對Code	使用試片需要對Code
品管	作業	24H必須執行品管作業 (執行品管後往後推24H)	24H必須執行品管作業 (每天的零點起算24H)
品管	結果紀錄	可由POCT系統直印出	可由GD40品管系統直印出
品管	允收範	允收範圍紀錄在儀器內,自動判 斷	允收範圍紀錄在儀器內,自動判斷
機器定	及時間設	血糖機設定.日期.時間連Server 時自動校正	血糖機設定.日期.時間連Server時自 動校正



血糖機使用時機

	品管作業	血糖量測
病房部門	QC Mode 每天固定班次 (ex. 小夜或大夜)	病人血糖測量掃條碼直接 入NIS
急診部門	QC Mode 每天固定班次 (ex. 小夜或大夜)	因無病患條碼,故使用緊急 模式, <u>但量測結果將無法進</u> <u>NIS</u>
門診及社區部門	QC Mode 當天執行血糖量測 前必須完成品管作 業	因無病患條碼,故使用緊急 模式, <u>但量測結果將無法進</u> <u>NIS</u>

[注意事項]

*不論哪種屬性的部門,建議品管及量測結束後,馬上同步儀器資料



[2] Fora S10血糖機簡介



血糖機按鍵說明



7



量測前準備事項

●S10 POCT血糖機

- ●血糖試片
- ●酒精棉片
- ●單次使用安全採血針









S10血糖機選單功能說明





[3] 如何量測血糖





單次安全針使用方式

- 採血處先用酒棉消毒
- 打開帽蓋, 並丟棄帽蓋
- 將欲採血部位壓緊,將採血針利用"按壓"方式採血
- 一次擠出血滴,收集血液樣本
- 針頭直接拋棄至感染性廢棄物桶中,不需要回套







蓋圖章!





病患模式

- 1) 開機, 選擇 "病患模式" 按s鍵確定
- 1) 掃瞄條碼: ①使用者 ②試片 ③<u>病患</u> 按s鍵掃描及確定
- 1) 插入試片
- 2) 採血, 試片吸入血樣
- 3) 取得結果
- 採血時,聽到嗶聲後稍停一 下再移開!





測量血糖注意事項:

•如果需要繼續量測下一個病患,請選擇 "Next Patient",就可免去掃描使用者與試片條碼,直接掃病患條碼。

•在測量的頁面(有條碼)可以一直量測病患,直至電池沒電。

•若機器在主畫面停滯10分鐘未使用機器會自動關機



[4] 如何執行品管





品管液注意事項



Level 1

(Y1)

● 正確使用方式

1. 品管液開瓶:請註明日期,如:12/21~3/20

2. 品管液使用:(a)使用時,搖晃均勻第一滴請丟棄

(b)滴於品管液瓶蓋上,方便吸取

(C)品管液用量需足量

● 保存方式

- 1. 品管液期限:開瓶後90天內有效,超過90天請丟棄
- 2. 品管液保存:(a)請保存在室溫30℃之下,請勿冷藏。

(b)請勿觸碰品管液滴口,以免造成污染 www.foracare.com.tw





Level 3

(B3)

注意:先黃色再藍色





1)開機,進入"品管模式 按s鍵確定

2)掃瞄條碼:
①使用者 ②試片 ③品管液
按s鍵掃描及確定
3)插入試片
4)試片吸入品管液
5)取得結果

注意:請依序操作二次, 先黃色再藍色





品管1 Op.: N223590458 Lot.: 21J24BDD26089C CS.: 21E171104B7







注意事項:

 品管液的允收範圍已經同步到儀器內,不需要再比對試片罐 資料;

•若品管出現異常,請執行下列步驟:



品管異常處理SOP

*出現違反品管規則時, [步驟一:基本檢查]

- 確認儀器電力充足 (若出現電池低電量圖示err003,請先將電池充飽電)
- 確認試片罐與儀器放在相同室溫下五分鐘
- 確認品管液效期及試片效期(開罐三個月內)、品管液第一滴不使用
- 上述項目確認後,請重新執行一遍品管流程
 若未通過執行步驟二

[步驟二:更換材料再次測試]

- 若只有一個濃度數據異常:
 - (1) 更換異常的品管液,重新測試

(2) 若仍未通過,請找醫檢部取得備機,重新執行品管程序。
若有兩個濃度數據異常:

- (1) 更換另一罐未開封試片, 重新測試.
- (2) 更換品管液,重新測試
- (3) 若仍未通過,請找醫檢部取得備機,重新執行品管程序。



[5] 如何使用緊急模式





緊急模式

1) 開機,進入"緊急模式" 按s鍵確定 1) 插入試片 2) 採血,試片吸入血樣

3) 取得結果

注意事項:

因無病患條碼,故使用緊急模式,

但量測結果將無法進NIS









[6]資料上傳(資料同步)









上傳資料 (方法一)

下拉『WiFi傳輸按鍵』,即可 啓用WiFi傳輸模式







資料上傳故障排除

儀器資料同步 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1.儀器尚未設定歸屬單位,請醫工部協助設定,再行使用



[7] 血糖機錯誤排除 - 符號與圖示說明 - 異常狀況排除指引



S10量測結果輔助指示圖

輔助 指示標誌	說	明
Less than 20 MC mg/dL	AC mg/dL 血糖值低於量測範圍20 mg/dL時出現。	
low	血糖值偏低 血糖值介於20-70 mg/dL時出現。	
high	high 血糖值偏高 血糖值介於180-240 mg/dL時出現。	
KETONE?	血糖值過高 KETONE? 血糖值介於240-600 mg/dL時出現。	
More than 600 ^{AC} 血糖值高於量測範圍600 mg/dL時出現。		



S10異常代碼說明

符號	意義	解決建議	更换
Err- 001	超過品管時效(超過24小時) (QC overdue)	重新操作品管流程	_
Err- 003	表示電池電量不足 (Battery voltage too low)	電池充電	—
Err- 024	表示已使用過的試片 (Test strip has been used)	重新插入新的試片	—
Err- 004	操作者ID錯誤 (Operator ID error)	重新掃描ID/確認	—
Err- 005	病患ID錯誤 (Patient ID error)	重新掃描ID/確認	—
Err- 006	試片批號掃描錯誤 (Test strip error)	確認試片是否過期 重新掃描試片批號	

若無法處理,於上班時間與醫工部更換新機。 下班時間請使用其它備用機器



S10量測異常狀況排除

狀況		處理方式	
•	按電源鍵超過十秒鐘, 儀器仍未顯示任何訊息	•	電力耗盡:請充電再使用
•	血液或品管液進入試片反應 區後,機器並未執行測試	1	血液量不足:重新採血並使用新試片。 試片損壞:使用新試片。
•	血糖檢查結果與平常量測值 差別太大	2	操作不正確:請詳閱操作步驟,並使用 品管液測試後,重新採血再測1次。 試片損壞:請確認試片在使用有效期限 內或開瓶後90天內,重新採血再測1次。 [註]也可能當天的確血糖值比較不同
•	品管液測試結果,不在容許 範圍內	i	使用前未摇匀:請重新摇匀品管液、捨棄 第一滴樣品。 試片損壞或品管液過期:使用新試片及品管 液再測1次。
•	試片插入,儀器沒有反應	•	請檢查試片插入的正反面是否正確



[8]Fora S10血糖機設備維護

- 儀器維護服務
- 備品庫存



儀器維護服務

儀器問題:

- (1)血糖機清潔:請用布沾水或使用中性清潔劑輕輕擦 拭即可
- (2) 血糖機保養:配合院方規定時間進行
- (3) 血糖機故障維修:預先置放備機醫工部

(a)於日間上班時間:

於MIS系統key請修單,當天與醫工部更換 (b)於下班時間及假日:

- * 先行以單位備機替換→下一個工作日與醫工部更換
- * 可向其他單位暫時借用, 但品管紀錄仍屬原單位



問題討論與實機操作演練





Thanks for your participation!