



Avamys™
fluticasone furoate

病患使用說明

120

sprays

本說明僅提供醫護人員予使用艾敏釋之病患，作為衛教育用途。


Avamys™

fluticasone furoate

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑

噴前 **用力搖**



噴時頭前靠



壓到底 最好

用完 **要蓋牢**



為什麼要用力搖呢？

因為艾敏釋鼻噴劑的藥液是懸浮液，靜置時呈現凝膠狀，一定要在使用前**用力的搖勻，才能變成液體**，順利的由噴頭噴出，否則易造成阻塞。

為什麼要頭前靠呢？

每次使用時將頭前靠以保持**瓶身直立**，才能將藥液正確的噴在鼻腔內。

為什麼一定要壓到底？

艾敏釋鼻噴劑為一個創新的給藥裝置，不管您側壓的速度快慢，您必須一次壓到底，才能保持**一致藥量順利噴出**。

為什麼要蓋牢？

在拿到未開封過之艾敏釋鼻噴劑，您必須先重複按壓**至少六次**，直到空中出現一團細緻的噴霧，才開始使用鼻噴劑，若您每次使用完都將蓋子**蓋牢**，就不需重複前述的動作。



荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

若您有任何醫療問題，請諮詢您的醫師。 TW/FF/0004/15u/Mar-2017