

顯影劑 用藥指導

- (2) 彈繃包紮(由手掌向手臂纏繞) 每日三次, 每次30分, 並避免包紮過緊, 發生手指發紫、變黑。
- (3) 首先1-3天予以冰敷, 每日3~4次, 每次15分; 並抬高患側肢體。
- (4) 再以溫熱敷3~5日, 每日3~4次, 每次15分; 仍需抬高患側肢體。

※若有起水泡, 不可弄破, 應以乾淨紗布覆蓋, 避免感染。

※若有下列症狀, 應立即就醫處理。

- (1) 皮膚紅、腫、熱、痛的情形加劇。
- (2) 患側突然失去活動能力。
- (3) 發生其他全身性症狀, 如呼吸困難、全身性紅疹、昏迷。

我的過敏記錄

日期	藥名	症狀



衛教資訊



重點提醒

本單張無法詳載所有衛教內容
有任何疑問請電洽

義大醫院 高雄市燕巢區角宿里義大路1號
電話: 07-6150011 轉 2257
義大癌治療醫院 高雄市燕巢區角宿里義大路21號
電話: 07-6150022 轉 6175

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人: 義大醫療財團法人

表單編號: HA-12-0007(1)

義大醫院 20X20cm 2016.01印製 2015.11新設

 義大醫療財團法人 編印
E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

顯影劑用藥指導

顯影劑作用

顯影劑是應用於醫學成像時(如: X光、電腦斷層..) 使組織間的對比更清楚的一種化學藥劑。加了顯影劑, 就像是打了燈光照相, 影像更清楚。

顯影劑種類

以顯影劑在體液中是以離子或分子狀態存在, 分為離子性及非離子性的顯影劑; 若以顯影劑的滲透壓來分的話, 有高滲透壓與低滲透壓兩種。

哪些為高危險族群病人

- ◆ 腎功能不良(Cr>1.8mg/dl)
- ◆ 曾經有顯影劑過敏病史
- ◆ 糖尿病正在服用Metformin
- ◆ 嚴重心臟衰竭
- ◆ 多發性骨髓瘤
- ◆ 肝硬化
- ◆ 甲狀腺功能亢進

常見副作用

- 非過敏類: 頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、心律不整。
- 過敏類: 皮膚發熱潮紅、皮膚疹、皮膚癢、支氣管收縮, 氣喘發作、喉部水腫、呼吸困難。

重點提醒

- 腎功能指數偏高, 經臨床醫師確認仍須施打顯影劑。為預防腎功能惡化, 要注意:
 - (1) 無攝取水份禁忌: 應補充適當水份(每小時100毫升, 至少6小時)。如有尿量減少或水腫狀況, 儘快到門診或急診檢查。
 - (2) 醫師囑咐需限水, 需再諮詢原主治醫師。
- 女性病患若需要施打顯影劑, 請務必主動告知醫療人員, 需確定沒有懷孕, 才能執行相關檢查。
- 有服用Metformin藥物控制糖尿病, 為預防併用顯影劑引起乳酸中毒, 請務必注意暫停服用Metformin 48小時, 其它降血糖藥仍可繼續服用。
- 施打顯影劑後, 檢查報告通常於檢查後五天即可完成, 記得回診聽報告。

顯影劑漏藥處理

- 基本步驟
 - (1) Hirudoid 藥膏(中文名:喜療瘀或喜療妥..)塗抹患部每日三次。