


☐ 儲存方式

請將藥品連同藥袋放置於密閉容器，於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。除稀釋後之懸浮液外，請勿冷藏。請勿放在孩童可以取得的場所。

抗生素藥品使用須知



院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000或2120

藥劑部 關心您

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售
著作權人：義大醫院

抗生素並不是消炎藥，不具直接消炎止痛作用；只有當細菌感染所引起的發炎症狀，消滅細菌後才能使感染部位的症狀改善。因此當身體產生炎症反應時，醫師會加以判斷是否為細菌感染來使用抗生素，請依醫師的指示下正確的使用抗生素。

☐適應症

抗生素具有消滅或抑制其他微生物生長之作用，用於治療微生物感染疾病。如我們所熟知之盤尼西林類、頭孢子菌素類、四環素類、紅黴素、胺基配糖體等。

☐如何適當使用抗生素

1. 一般抗生素空腹(飯前一小時或飯後兩小時)吸收效果較好，並以一大杯開水併服。若對胃部造成刺激，則與食物一起服用為宜。
2. 如為口服之長效釋放錠，請勿咬碎。如為口服懸浮液，使用前要搖勻，並使用量杯或包裝盒內所附之滴管，量取正確之藥量。

☐注意事項

1. 不可自行減少劑量，過低的劑量不僅無法完全殺死細菌，反而更易導致存活的細菌產生抗藥性。
2. 服藥天數(療程)足夠：一般使用抗生素應持續一定的天數，必須將醫師所開的抗生素，按照時間全部服用完，如果因為幾天後症狀改善而自行停藥，可能會復發或造成抗藥性產生。
3. 四環素類易致牙齒琺瑯質發育不全及永久性變色，故禁用於 8 歲以下之兒童，孕婦及授乳婦女。此外，此類藥可能會對光敏感，因此避免過度暴露於日光燈或太陽下。
4. 蠶豆症患者要避免使用磺胺類抗菌劑，以防止產生溶血性貧血。
5. 有些如四環素類、氟化萘類抗生素會與鈣、鎂、鋁、鐵等離子結合而失去藥效，故應避免與牛奶、乳製品、制酸劑及和鈣、鐵質高的食物併服。
6. 若曾有藥物過敏、計畫懷孕或懷孕及授乳、正服其他藥的情況，請務必告知醫師來加以評估決定是否使用。
7. 抗生素之懸浮液粉劑請依藥袋指示泡製後再行服用，並須置於冰箱儲存，依藥品種類之不同，稀釋後之保存期限為 7~14 天。