

儲存方式

- 1.請於室溫陰涼乾燥處避光儲存，除非有特別指示。
- 2.若使用說明書上有特別註明要冷藏則依說明來放置。
- 3.請置放在孩童不易取得的場所。

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫院

表單編碼：HA-2-0018(1)

2013.04印製

2012.03修訂

鼻噴劑 的使用方式

 義大醫院
E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000

藥劑部 關心您

使用方法

- 1.使用前先將鼻腔內部清潔乾淨。
- 2.充份搖動藥瓶，使藥液均勻分佈。



- 3.以食指、中指各夾住藥瓶上方，
拇指夾住藥瓶下方。



- 4.拇指壓住一邊鼻孔，將噴嘴插入
另邊鼻孔，頭稍向前傾，噴霧器
保持垂直。



- 5.手按壓噴嘴，用鼻吸入噴出之氣
霧，再用口呼氣。

- 6.換另一邊鼻孔重複此程序。



- 7.每次使用後，請用紙巾或面紙擦
拭乾淨噴嘴，再蓋回瓶蓋。



注意事項

- 1.若出現鼻黏膜乾燥刺激感及過敏等現象(如眼睛流淚、發癢)請告知醫師。
- 2.勿使用超過建議的劑量或醫師指定的次數，以免增加副作用。
- 3.使用鼻噴劑的方式，除了**迷你寧**鼻腔噴霧劑，使用時，頭稍向後傾外，其餘皆為頭稍向前傾，並請盡量保持藥瓶瓶身直立。
- 4.按壓時需用力、快速向下壓，如此噴出的藥劑量才能較完全。
- 5.若醫師無特別指示，治療鼻炎的鼻噴劑處方一次一噴時，即表示每次用藥左右鼻孔皆需各噴一下。
- 6.若使用治療**骨質疏鬆症**及**尿崩症**之鼻腔噴霧劑時，若醫師囑咐您每次一噴，表示每次用藥只需選擇一個鼻孔噴一下即可。