

## 儲存方式：

1. 除非有特別指示，請於室溫陰涼乾燥處避光儲存。若使用說明書有特別註明要冷藏則要依說明來儲存。
2. 藥品應放在孩童不易取得的場所。

本著作非經製作全人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫院

表單編碼：HA-2-0019(1)

2013.01印製 2012.03修訂

# 陰道栓劑 的使用方式

 義大醫院  
E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000

藥劑部 關心您

## 使用方法：

1. 使用前，先將指甲剪短，洗淨雙手。
2. 將陰道栓劑的外包裝去除。
3. 可戴上手套，以免污染藥品。
4. 採蹲姿或仰臥姿的方式，兩腿曲起向外張開，用食指或中指把陰道栓劑輕推入陰道口。
5. 放妥後，再用食指小力緩緩的把陰道栓劑推進陰道最裡面(約深3-5公分)，即陰道窟窿處，如此較不易掉出來。
6. 若感到陰道乾澀不好推入時，可在陰道栓劑前緣塗少許乳液或凡士林，或沾點溫開水做潤滑，有助推入陰道栓劑。



## 注意事項：

1. 請依照藥物的治療療程連續使用完畢，不可擅自中斷。
2. 若感到陰道不舒適(如燒灼或刺激感)，建議回診告知醫師。
3. 用藥期間時應避免房事，以防止再度感染。
4. 陰道栓劑在陰道內時，會慢慢溶解而會有粘稠或水液狀的液體分泌物排出，乃屬正常現象，勿立即進行陰道之沖洗。
5. 於睡覺前使用，可使藥品停留在陰道的時間延長而提高療效。
6. 為避免重複感染及避免在衣褲上污染，對陰道口清潔時，最好用紙巾或棉墊。