

## 儲存方式：

1. 除有特別指示，請置於室溫陰涼乾燥處。若有特別註明要冷藏，則需要依說明來儲存。
2. 放在孩童不易取得的場所。

本著作非經製作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫院

表單編碼：HA-2-0022(1)

2012.10印製 2012.10新設

# 肛門栓劑 的使用方式

 義大醫院  
E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號



本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000

藥劑部 關心您

## 使用方法：

1. 使用前，先洗淨雙手。
2. 將藥物栓劑外包裝去除。
3. 若只要使用半顆栓劑，可用乾淨的刀片將栓劑切半。
4. 用水溶性的潤滑劑來潤滑栓劑前端(不要使用凡士林)，如果沒有水溶性的潤滑劑，可以溫水來潤濕肛門部位。
5. 身體側躺，下方腳伸直， 上方的腳彎曲。
6. 把臀部往上拉高以露出肛門部份。
7. 另一手用手指將栓劑尖端部份插入直腸括約肌(栓劑進入的深度，小孩約1.5公分；成人約2.5公分)，若塞入深度不足，栓劑可能會被排出
8. 臀部向內壓幾秒鐘。
9. 維持躺下的姿勢約15分鐘，以防有栓劑排出的反應。
10. 洗淨雙手以去除殘留餘藥品。

## 注意事項：

1. 肛門使用的製劑不可用於身體其他部位。
2. 若病情未改善或更糟，或感到以前沒有過的肛門不舒服感(如燒灼或刺激感等)，要儘快讓醫師或藥師知道。
3. 栓劑如軟化或融化時，以原包裝放回冰箱冷藏即可凝固。
4. 藥品不使用時應維持藥廠原包裝，不得自行拆裝，以免藥品變質失效。