

Bonviva

| 主成分 | 含量 | 英文商品名 | 中文商品名 |
|-------------|-----------------|---------|-------|
| Ibandronate | 3mg/3ml/syringe | Bonviva | 骨維壯 |

■ 作用

1. 治療和預防**骨質疏鬆症**。
2. 骨維壯是一種**雙磷酸鹽類藥物**，施打 1 年之後可增加全體骨**骨密度**達 2.1%。

■ 使用方式

1. 每 3 個月靜脈注射施打 1 劑。
2. 治療骨質疏鬆症的時間長短須與您的醫師進行討論。
3. 停止治療的病人仍應定期重新評估骨折的風險。

■ 注意事項

1. 接受骨維壯治療前，應考慮先進行常規的牙齒檢查。
2. **治療期間請保持好個人口腔衛生。**
 - (1) 每天保持餐後及睡前刷牙習慣以維持口腔清潔，並**經常漱口**以保持口腔濕潤。
 - (2) 如果您正在接受牙科治療或將接受牙科手術，請告知您的牙醫師，您正在接受雙磷酸鹽類成分藥品治療。
3. 骨維壯施打後可能出現**急性期反應**徵象與症狀，包括發燒、肌肉疼痛、類流感症狀、頭痛及關節痛。其中多數的症狀發生在投藥後的前 3 天內，通常會在症狀出現後的 3 天內**緩解**，持續時間不超過 7 天。
4. 請與醫師配合規則回診治療，盡可能於同一醫療機構施打，以利醫師追蹤和評估。
5. 有任何不適，建議回診詢問醫師。
6. 治療期間建議每日均衡攝取鈣與維生素 D。

■ 副作用

頭痛、頭暈、疲倦、腹痛、腹瀉、泌尿道感染、肢體疼痛、關節痛、肌肉痛、支氣管炎、肺炎和高血壓。

■ 需要就診追蹤之情況

1. 持續感覺口腔牙齦疼痛、腫脹、化膿、唇或顏面麻木感、牙齒鬆動或脫落、齒槽骨暴露、牙齒傷口無法癒合等症狀，您可能有顎骨壞死的風險。
2. 持續感覺到大腿、鼠蹊部或髖部疼痛，您可能有非典型大腿骨骨折的風險。

■ 請告知醫師

若以下症狀發生應主動告知您的醫師，例如：

1. 貧血、頭痛、高血壓、噁心、嘔吐、骨骼肌肉等處疼痛、發燒、疲倦、水腫等。
2. 有牙周病或其他先前患有口腔疾病病史。
3. 有低血鈣。
4. 曾經有過嚴重的腎臟問題、腎衰竭或需要透析治療。
5. 曾接受過副甲狀腺或甲狀腺手術。
6. 曾被告知您的胃及小腸對礦物質的吸收有困難。
7. 正在接受化療或放射線療法。
8. 正在服用類固醇。

資料來源：藥品說明單(2016 年)

若您仍有使用藥物之相關問題，請再詢問您的醫師或藥師。

諮詢專線：義大醫院 (07)6150011 轉 2000；義大癌治療醫院 (07)6150022 轉 6200；

義大大昌醫院 (07)5599123 轉 7200

藥物相關顎骨壞死併發症 MRONJ

(Medication-related Osteonecrosis of the Jaw)

1 哪些藥物可能有風險？

| 藥名 | 商品名 | 中文名 | 給藥方式 | 頻次 |
|--|------------------|--------|------|-----|
| 1. 骨質疏鬆 (雙磷酸鹽類) | | | | |
| Alendronate 70mg + Colecalciferol 5600IU | Fosamax Plus | 福善美保骨錠 | 口服 | 每週 |
| Zoledronic acid 5mg/100ml/vial | Aclasta | 骨力強 | 靜脈注射 | 每年 |
| Ibandronate 3mg/3ml/syringe | Bonviva | 骨維壯 | 靜脈注射 | 每季 |
| 2. 癌症骨轉移 (雙磷酸鹽類) | | | | |
| Zoledronic acid 4mg/5ml/vial | Zodonic (Zometa) | 羅立骨 | 靜脈注射 | 每月 |
| 3. 骨質疏鬆 (RANKL單株抗體) | | | | |
| Denosumab 60mg/ml/syringe | Prolia | 保骼麗 | 靜脈注射 | 每半年 |
| 4. 癌症骨轉移 (RANKL單株抗體) | | | | |
| Denosumab 90mg/ml/syringe | Xgeva | 癌骨瓦 | 靜脈注射 | 每月 |

2 什麼是顎骨壞死？

骨細胞的新陳代謝受干擾而有骨壞死的現象，可能是下顎骨、或上顎骨的骨頭壞死(ONJ – osteonecrosis of the jaw)。

雙磷酸鹽類藥物的使用抑制破骨細胞活性，造骨細胞活性及數目降低，可能導致新骨無法形成，傷口無法癒合，顎骨壞死，進而感染發生骨髓炎。

其他相關機轉可能是因抑制血管增生，壓抑骨的新陳代謝，口腔易有傷口及細菌感染，進而感免疫功能失調。



3 顎骨壞死有哪些症狀？



牙齒鬆動



牙齦潰瘍



牙齦腫脹化膿



下顎及唇麻木



口腔疼痛




齒槽骨暴露



牙齒細菌感染

4 哪些人具風險因素？



年紀超過 65 歲



糖尿病



口腔清潔衛生不好



抽菸



多發性骨髓瘤、乳癌、攝護腺癌、肺癌...等



化學、類固醇治療、抗血管新生療法



牙周相關疾病



不合的假牙/贗復物



牙科手術(含拔牙)

5 如何減少顎骨壞死的風險？

使用 前

1. 確認口腔狀況，有無明顯牙齦出血、發炎等狀況。
2. 若即將進行牙科手術、植牙、拔牙等侵入性牙科治療，建議先處理完善後再接受此類藥物之治療。

使用 期間

1. 請保持好個人**口腔衛生**，經常漱口以保持口腔濕潤。
2. 定期至牙科門診接受口腔保養，有機會降低風險。
3. 避免過度刺激、粗糙、容易造成口腔黏膜受傷的飲食。
4. 若須進行牙科手術、植牙、拔牙等侵入性牙科治療，**請先告知牙醫師您正在使用此藥物**，經牙醫師評估後才可施行。
5. 若持續感覺口腔牙齦疼痛、腫脹、化膿、唇或顏面麻木感、牙齒鬆動或脫落、齒槽骨暴露、牙齒傷口無法癒合等症狀，請盡快回診。