



掃 QR Code 聽語音

Edoxaban 用藥指導

主成分	英文商品名	中文商品名
Edoxaban	Lixiana	里先安

■ 藥品外觀

60 毫克/錠	30 毫克/錠

■ 作用

抗凝血劑，可以防止血栓形成。

■ 使用方式

1. 請依醫師指示，固定時間服用。
2. 空腹或飯後服用均可。

■ 注意事項

1. 使用前請主動告知醫療人員
 - (1) 您所有正在使用的藥品、中草藥及健康食品。
 - (2) 目前或計畫懷孕或哺乳。
2. 請勿自行停藥或調整劑量。若中斷治療可能導致栓塞或中風。
3. 日常活動時請小心，避免受傷或跌倒。刷牙或刮鬍子儘量選用軟毛牙刷及電動刮鬍刀。若您跌倒(尤其是頭部受到撞擊)，請立即就醫。
4. 請告知所有照顧您的醫療人員您正在服用此藥品。若要接受手術、拔牙、內視鏡檢查或其他可能造成出血的檢查，請主動提早告知醫師您正在服用此藥品。
5. 若您本身有高血壓病史，當血壓偏高時(收縮壓超過 180 毫米汞柱)，請您盡快回診。

6. 里先安可能會與其他藥品(如血小板凝集抑制劑【阿斯匹靈或保栓通等】、非類固醇類消炎止痛藥等)、中草藥/健康食品(如丹參、當歸、銀杏、人參、薑黃、大蒜精、薑粉、魚油、維他命 E【每日>300 國際單位】等)產生交互作用而增加出血危險。
請避免自行服用其他藥品、中草藥或健康食品。如有需求，請諮詢醫師或藥師。

■ 副作用

1. 若有下列情況請**立即就醫**。症狀嚴重時請至急診。
 - (1) **過敏**：如皮膚紅疹、搔癢、起水泡、脫皮。胸悶，呼吸、吞嚥或說話困難。臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - (2) **出血**：如咳血、嘔吐物有血或呈現暗咖啡色。不明原因瘀青或瘀青變嚴重。不正常牙齦出血或經血過多。解血尿、血便或黑便。
 - (3) **神經學症狀**：嚴重頭痛、頭暈、身體單側無力或麻木、口齒不清、說話困難、意識混亂、視力模糊、走路不穩。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 想起時盡快補服藥品。
2. 若想起時已接近下次服藥時間，則按照原訂時間服用下一次劑量。
3. 不可一次服用 2 倍劑量。

■ 藥品儲存

請存放於陰涼乾燥處、避免陽光直射。

《本單張無法詳載所有資訊，如有疑問請諮詢您的醫師或藥師》

聯絡資訊		
義大醫院 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話：07-6150011轉2000	義大癌治療醫院 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路21號 電話：07-6150022轉6200	義大大昌醫院 地址：高雄市三民區大昌一路305號 電話：07-5599123轉7200