

Fentanyl 用藥指導

主成分	含量	英文商品名	中文商品名
Fentanyl	12mcg/hr/patch	Durogesic	多瑞喜穿皮貼片劑
	25mcg/hr/patch	Fentanyl	吩坦尼穿皮貼片劑
	50mcg/hr/patch	Fentanyl	吩坦尼穿皮貼片劑

■ 作用

1. 穿皮貼片劑能提供持續 72 小時的 fentanyl 全身釋放，fentanyl 是一種強效的類鴉片麻醉止痛劑。
2. 適應症：需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

■ 使用方式



1. 選擇適當部位(建議上背部、胸部鎖骨下或上臂)，清洗擦拭乾淨。
2. 剪開切口打開包裝(勿切割到貼片)，取出貼片。
3. 移除貼片上的背膠(多瑞喜穿皮貼片劑有 S 型切口可將背膠撕除)。



4. 黏貼於皮膚，輕壓 30 秒使其黏貼更緊密。
5. 使用後以清水洗手，勿用肥皂。
6. 於貼片使用紀錄表上紀錄使用日期及時間。
7. 3 天後撕下貼片，對黏後放入夾鏈袋中，回診時連同紀錄表繳回藥局回收。

■ 注意事項

1. 使用部位：貼於無刺激、乾淨、無毛髮、表面平坦的皮膚，較佳位置為**上背部、胸部鎖骨下或上臂**。避開傷口或放射治療部位，黏貼前皮膚須清潔並完全乾燥。
2. 黏貼多久：**每 3 天更換一次，每次貼換不同部位**。
3. 為確保整片貼片完全與皮膚接觸，要注意角落部位應緊密黏貼，可使用透氣膠帶黏貼於貼片邊緣加強固定。
4. 貼片完整性：貼片為特殊緩釋劑型，不可隨意切割貼片（特別是貼片邊緣）。
5. 紀錄表與廢棄貼片回收：須確實記錄貼片使用狀況(貼上及撕下的日期時間並簽名)，使用過的貼片放入夾鏈袋中，連同紀錄表一併交回藥局。
6. 可洗澡及游泳，但避免將貼片直接暴露於外部熱源(如電熱毯、暖暖包等)
7. 如發生急性疼痛，勿自行增加貼片數量。

■ 副作用

常見副作用為噁心嘔吐，便秘與皮膚發紅發癢等。

如有嗜睡、呼吸次數驟減或呼吸困難等嚴重副作用情況，請立即停用並回診。

■ 藥品儲存

1. 置於未開封之原包裝內，貯於 25°C 以下。
2. 貼片使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。

聯絡資訊

義大醫院 地址:高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話:07-6150011轉2000	義大癌治療醫院 地址:高雄市燕巢區角宿里義大路21號 電話:07-6150022轉6200	義大大昌醫院 地址:高雄市三民區大昌一路305號 電話:07-5599123轉7200
---	---	---