

注意事項：

1. 曾對此藥過敏或有其他疾病（肝腎功能不佳、糖尿病、高血壓、心臟衰竭、癲癇、癌症等），請先告知醫師。
2. 懷孕、須哺乳或正在服用其他藥品者，應先告知醫師，服藥期間懷孕者也請告知醫師。
3. 服藥期間，請定期回診抽血檢查，以確定藥物的效果及避免副作用的發生。
4. 使用此藥可能引起眩暈、嗜睡，應避免開車或操作及從事危險活動。
5. 避免飲酒或食用富含嘌呤類食物（如沙丁魚、內臟類、豆類）。
6. 服藥期間，應避免攝取大量維他命 C，可能易導致腎結石。

保存方法：

1. 藥品須存放在室溫、乾燥陰涼的環境下。
2. 請置於兒童不易取得之處所。

本著作非經製作全人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫院

表單編碼：HA-2-0020(1)

2012.07印製 2012.07新設

Allopurinol

用藥指導



院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000

藥劑部 關心您

學名：Allopurinol 100mg

商品名：Allopurinol (安樂普諾)

藥品外觀：淺紅色圓扁形錠劑，
有STD/102字樣。



用途：

1. 治療痛風症、痛風性關節炎或高尿酸血症。
2. 治療某些特定型態之尿酸結石。

用法：

1. 請依照醫師指示服用藥品，切勿自行停藥。
2. 於飯後服藥可以減少腸胃不適感。
3. 為減少腎結石或痛風的風險，若無其他限水顧慮，建議每日喝10-12杯的水（約250毫升/杯）。

假如您發生下列的副作用 請停藥並立即就醫

1. 皮膚有小紅點或紅腫、皮疹發癢、疼痛或脫皮。
2. 發冷、發燒或喉嚨痛。
3. 關節或肌肉疼痛。
4. 嘔心和嘔吐（特別於出現皮疹之後）。
5. 呼吸困難、喘或胸悶。
6. 排尿困難、血尿。
7. 眼睛發炎。
8. 口唇腫脹、口腔潰瘍。
9. 皮膚或眼白泛黃。
10. 不尋常流血、瘀血。

假如下列症狀持續發生時，請告知 醫師：

腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、困倦感、頭痛、不尋常地掉髮。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用；如果與下次服藥時間相近，則忽略遺漏的劑量，按時服用下次的劑量，千萬不可服用2倍劑量。