

Asunaprevir

主成分	含量	商品名	中文商品名
Asunaprevir	100 mg/soft cap.	Sunvepra	速威干軟膠囊

作用：

本品為 HCV NS3/4A 絲胺酸蛋白酶複合體的抑制劑，乃一種可對抗 C 型肝炎病毒的直接作用型抗病毒劑(DAA)。

劑量與用法：

1. 建議劑量為一天兩次，每次一顆，可隨餐或不隨餐服用。
2. 常併用 daclatasvir 或併用 daclatasvir、peginterferon alfa 及 ribavirin，使用 24 週。

注意事項：

1. 不可作為單一治療藥物，可能併發肝毒性，在最初的四個月至少每兩週監測一次 ALT、AST 及總膽紅素，之後每四週監測一次，直到療程結束。
2. 若產生進行性疲倦（感覺很累）或黃疸（皮膚或眼白變黃），請立即告知醫生，評估是否有產生肝毒性。
3. 本品的生殖毒性未有相關研究，但其併用藥物皆禁止使用於孕婦，若有懷孕情況請告知醫生。於動物試驗中會分泌進乳汁，故建議病人勿哺餵母乳。
4. 本品之排除牽涉酵素 CYP3A4 且為 CYP2D6 抑制劑，故服藥期間勿食用葡萄柚汁。
5. 若有使用其他藥物（例如：抗凝血劑、心血管藥物、荷爾蒙避孕藥等），請告知醫生。
6. 請勿自行停藥或更改藥量，若有疑問或不適，請聯絡醫生或藥師進行評估。

忘記服藥時的處理方式：

若距離下次服藥時間大於六小時請儘快補吃。但若已小於六小時則不要補吃，等下次服藥時間再開始按時服藥即可，千萬不可服用雙倍劑量。

副作用：

最常見為疲倦、頭痛、搔癢、虛弱、類流感症狀與失眠、皮疹，大部份不良事件皆為輕至中度的反應。

保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境。

資料來源：仿單、廠商衛教單張。