



8. 若血鉀值異常，應避免和高鉀食物（如草莓、大頭菜、茼蒿等）併用。
9. 不可和葡萄柚汁及柚子併服。
10. 注意發燒寒顫等情形應立即就醫。
11. 此藥會和其他藥物有交互作用，所以當您有在服用其他藥物請告知醫師。
12. 建議病人避免過度曝露在紫外線之下。

保存方式：

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得處。

Cyclosporin 新體睦軟膠囊

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊
有任何疑問時請電
(07)6150011轉2000或2120
藥劑部 關心您



成份名：Cyclosporin

商品名：Sandimmun Neoral 25mg/cap

Sandimmun Neoral 100mg/cap

中文名：新體睦軟膠囊

藥品外觀：



用途：用於預防器官排斥

用法：通常每 12 小時服用一次

可能引起的副作用：

可能引起腎功能異常、肝功能異常、高血壓、高血糖、胃腸不適、震顫、高血鉀、高血脂及增加感染的情形、多毛症、齒齦增生等副作用。

如果忘記吃藥了怎麼辦？

1. 如果忘記服藥，當記起時儘快補服，如已接近下一次服藥的時間，則服用下一劑即可。
2. 如果忘記服藥次數超過一次劑量時，請與醫師聯絡。

注意事項：

1. Cyclosporin 響免疫力，易引起感染。若出現感染症狀，應立即告知醫師或藥師。
2. 勿自行注射疫苗。
3. 按時回診並確實遵照醫囑服藥，切勿擅自增減藥量或停藥。
4. 食物會降低藥物的吸收所以建議空腹服用。
5. 若有高血壓，每日定時測量血壓、脈搏並列入記錄，於就診時提供醫師參考。
6. 懷孕、正授乳中、藥物食物過敏記錄、服藥後的反應或身體相關事項，應主動告知醫師以利治療參考。
7. 勿將藥品給予他人使用。