

Daclatasvir

主成分	含量	商品名	中文商品名
Daclatasvir	60 mg/tab.	Daklinza	坦克干膜衣錠

作用：

本品為 NS5A 的抑制劑，乃一種可對抗 C 型肝炎病毒基因 1、1b 型的直接作用型抗病毒劑 (DAA)。

劑量與用法：

建議劑量為一天一次，每次一顆，可隨餐或不隨餐服用。

不可單獨使用，必須併用 Sunvepra 或併用 Sunvepra、peginterferon alfa 及 ribavirin，療程為 24 週。

注意事項：

1. 不可作為單一治療藥物，其合併藥物(Sunvepra)可能併發肝毒性需要按時監測 ALT、AST 及總膽紅素，直到療程結束。
2. 目前並無任何適當且控制良好的孕婦研究。但建議不要在懷孕期間使用或用於具生育能力但未採取避孕措施的婦女。在治療結束之後，應持續採取有效的避孕措施 5 週。於動物試驗中會分泌進乳汁，故建議病人切勿哺餵母乳。
3. 本品之排除牽涉酵素 CYP3A4，故期間勿食用葡萄柚汁。
4. 若有使用其他藥物 (例如：抗凝血劑、抗癲癇、抗結核、荷爾蒙避孕藥等)，請告知醫生。
5. 勿自行停藥或更改藥量，若有疑問或不適如心律不整等，請聯絡醫生或藥師進行評估。

忘記服藥時的處理方式：

若距離下次服藥時間大於 12 小時請儘快補服。但若已小於 12 小時則不要補吃，等下次服藥時間再開始按時服藥即可，千萬不可服用雙倍劑量。

副作用：

頭痛、疲倦、腹瀉、鼻咽炎及噁心，大部份不良事件皆為輕至中度的反應。

保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境。

資料來源：藥品仿單