

Dasabuvir

主成分	含量	商品名	中文商品名
Dasabuvir	250 mg/tab.	Exviera	易奇瑞膜衣錠

作用：

Dasabuvir 是由 NS5B 基因編碼的 HCV-RNA 依賴 RNA 聚合酶的非核苷抑制劑，用以治療成人慢性 C 型肝炎基因型 1 之感染。

劑量與用法：

建議劑量為一天兩次，每次一顆，需隨餐服用以增加吸收。

必須併用 Viekirax 或同時併用 Viekirax 和 Ribavirin，療程依病情分為 12 或 24 週。

注意事項：

1. 不可作為單一治療藥物，可能產生肝毒性，引起嚴重肝臟問題，特別是具有特定類型肝硬化的人，故應於起始治療前、及展開治療後的前四週以及臨床上有需要時監測 ALT、AST 及總膽紅素，直到療程結束。
2. EXVIERA 可能會使您的肝功能血液檢查結果升高，特別是當您使用含有 ethinyl estradiol 之藥物時(例如某些避孕藥)。
3. 目前用於懷孕女性的資料相當有限。建議不要在懷孕期間使用。且需採取有效的避孕措施。於動物試驗中會分泌進乳汁，故建議病人切勿哺餵母乳。
4. 本品之排除牽涉酵素 CYP2C8，故相關藥物的使用(如降血脂藥 gemfibrozil)需小心。
5. 若有使用其他藥物 (例如：抗凝血劑、抗痙攣、抗黴菌、抗結核、降血脂、荷爾蒙避孕藥等)，請告知醫生。
6. 請勿自行停藥或更改藥量，若有疑問或不適 (例如：疲累、虛弱、皮膚或眼部發黃、食慾不振、糞便顏色改變、意識混淆等)，請立即告知醫師或藥師進行評估。

忘記服藥時的處理方式：

若忘記服藥且距離下次服藥之時間未滿 6 小時，則應儘速隨餐服用忘記的劑量。若時間超過 6 小時，請跳過並直接依據預定時間隨餐服用下個劑量，千萬不可服用雙倍劑量。

副作用：

使用三合一時，常見副作用為疲累、噁心、發癢、皮膚反應 (發紅或皮疹)、睡眠問題、感覺無力。使用二合一時，常見副作用為噁心、發癢、睡眠問題。

保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境。

資料來源：仿單、衛教單張。