




"永信"

# 司樂舒 口服液

## SlipFee l

Oral Saline Laxative "Yung Shin"



### 檢查時間：

民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 星期\_\_\_\_ 上午/下午 \_\_\_\_\_

### 檢查/手術前飲食之注意事項：

1. 檢查前兩日(\_\_\_\_月\_\_\_\_日)起請食用低渣食物(稀飯、白吐司、饅頭、白飯、白乾麵等)，不宜食用高纖高蛋白及肉類食物。
2. 檢查前一日(尤其晚餐)建議採清流質飲食，並於晚上6點以前進食完畢。

### 服用司樂舒口服液，清腸準備：

1. 第一劑加入240c.c.的水或無渣飲料，建議至少再喝2000c.c.的冷飲或水，以利清腸及避免連續腹瀉造成脫水。
2.  上午檢查第二劑加入\_\_\_\_\_c.c.的冷開水，總水量  
不超過\_\_\_\_\_c.c.，之後即禁食(包括水)。  
 下午檢查：如同第一劑方法飲用即可。

#### 上午檢查

確認

第一劑：

\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時 服用

第二劑：

\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時 服用

#### 下午檢查

確認

第一劑：

\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時 服用

第二劑：

\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時 服用

### 注意事項：

- 1.若您正在服用其他藥物，服用清腸藥前請詢問醫師，以利評估用藥安全，並按照醫師指示服用，避免交互作用。
- 2.服用第一劑及第二劑司樂舒，前後至少相隔10~12小時使用。
- 3.急性胃腸潰瘍、阻塞或不明原因腹痛者，請勿任意服藥。
- 4.服藥後約30~60分鐘開始清腸作用，作用時間約4小時(依個人體質而有所不同)。
- 5.先天性巨大結腸、腸阻塞、閉鎖性肛門、充血性心臟衰竭、腎臟功能不全者請勿使用本藥品。
- 6.如有任何疑問，歡迎電詢\_\_\_\_\_



"永信"



永信關心您的健康

【成份】每毫升(mL)中含：

Sodium phosphate monobasic....480mg  
Sodium phosphate dibasic.....180mg  
(每mL含鈉111.3mg)

【適應症】

緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

### 檢查前飲食建議

(1) 檢查前2日三餐飲食須為低渣飲食，如稀飯、白吐司、饅頭、白飯、白乾麵或低渣飲料，如運動飲料。



稀飯



白吐司



饅頭



白飯



白乾麵

(2) 不宜食用高纖維(青菜&水果)、高蛋白(牛奶&其他奶製品)、肉類、有渣或色素較深之飲料以及油炸食物。



蔬果



起司



牛奶



清湯



濾過渣的果汁



運動飲料

(3) 檢查前1日(尤其晚餐)宜為全流質飲食，如粥湯、魚湯、運動飲料(牛奶除外)。

※ 請務必遵守飲食建議，以達到良好的清腸效果，避免干擾檢查結果之判讀。