

Harvoni

主成分	含量	商品名	中文商品名
Ledipasvir Sofosbuvir	90 mg/tab. 400 mg/tab.	Harvoni	夏奉寧膜衣錠

作用：

治療成人的慢性 C 型肝炎(chronic hepatitis C,CHC)基因型 1 感染症。Ledipasvir 是 HCV NS5A 抑制劑；Sofosbuvir 則是一種屬於核苷酸類似物的 HCV NS5B 聚合酶抑制劑。

劑量與用法：

一天一顆，可隨餐或不隨餐使用，療程依病情分為 12 或 24 週，勿自行增減劑量。

注意事項：

1. 常併用 Ribavirin，但不建議併用其他含有 sofosbuvir 成分的產品或降血脂藥物 rosuvastatin。若有併用 ribavirin 時則禁止用在孕婦或男性患者其伴侶有身孕，計畫懷孕者請告知醫師。
2. 輕至中度腎功能不全者無須調整劑量，無重度或接受透析者相關研究。
3. 目前用於懷孕女性的資料相當有限，建議只有效益大於風險時才可在懷孕期間使用。於動物試驗中會分泌進乳汁，故使用時應評估利益與風險，提前告知醫師。
4. 若有使用其他藥物（例如：降血脂藥物 rosuvastatin 或抗心律不整藥物 amiodarone, digoxin、抗癲癇藥物等）請告知醫生。本身若有哺乳、腎臟疾病、其他肝臟疾病(如 B 肝等)、心臟病、肝移植等請先告知醫師。
5. 併用制酸劑時，請間隔四小時以上。
6. 請勿自行停藥或更改藥量，若有疑問或不適，請聯絡醫生或藥師進行評估。

忘記服藥時的處理方式：

若距離下次服藥時間大於 12 小時請儘快補服。若時間超過 12 小時，請跳過並直接依據預定時間服用下個劑量。千萬不可服用雙倍劑量。

副作用：

較常見副作用為疲累、頭痛、噁心、腹瀉或失眠等。伴有肝硬化之病人，可能會另有虛弱、咳嗽、肌痛、呼吸困難、急躁或暈眩等副作用。

保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境

資料來源：仿單、Micromedex。