

7. 勿將藥品給予他人使用。
8. 若出現嚴重腹瀉的情形應告知醫師。
9. 注意發燒寒顫等情形應立即就醫。
10. 婦女在服藥期間應有完整的避孕措施，孕婦避免使用此藥品。
11. 服用此藥要避免過度曝曬在陽光及紫外燈下。

保存方式：

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得處。

Mycophenolate 山喜多膠囊

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊
有任何疑問時請電
(07)6150011轉2000或2120
藥劑部 關心您

學名：Mycophenolate

商品名：Cellcept 250 mg/cap

中文名：山喜多膠囊

藥品外觀：



用途：用於預防器官排斥

用法：通常每 12 小時服用一次

可能引起的副作用：

胃部不適、嘔吐、腹瀉、白血球降低、瘀血或不正常出血、周邊水腫、伺機性的感染及血球低下等副作用。

如果忘記吃藥了怎麼辦？

1. 若忘記服藥，應儘快補服忘記的劑量；但若很接近下次服藥時間，則不必補服忘記的劑量。
2. 若忘記服藥次數超過一次劑量時，請與醫師聯絡。

注意事項：

1. 服用 Mycophenolate mofetil 較易引起感染，所以避免接觸患有傳染性疾病如流行性感冒的親戚朋友。
2. 食物會降低藥物的吸收所以建議空腹服用。
3. 藥品粉末具有致畸胎的危險服用實不應該將膠囊打開或咬碎。
4. 避免藥品粉末和皮膚、黏膜及眼睛接觸，若不慎接觸應立即以清水或肥皂沖洗。
5. 若忘記服藥，應儘快補服忘記的劑量；但若很接近下次服藥時間，則不必補服忘記的劑量。
6. 服用此藥時藥注意不正常的出血及皮膚淤青的情形。