

## 注意事項

1. 若您曾對nitroglycerin或其他nitrates及nitrites 類藥物有過敏反應或正在使用其他藥物(尤其是心血管用藥物)時應先告知醫師。
2. 孕婦或授乳婦用藥前應與醫師討論。
3. 使用此藥可能引起眩暈、嗜睡，應避免開車或操作及從事危險活動。
4. 本藥易受潮，若藥物成粉狀則可能已經失效，應定期回診，並告訴醫師您胸痛的頻率及嚴重度。
5. 本藥物避免與「威而剛」併服，可能會導致嚴重的低血壓。

## 保存方法

1. 除非服藥，否則不要打開瓶蓋。
2. 使用後務必將蓋子轉緊，若要取用1粒NTG舌下錠時，先倒出數粒藥品到瓶蓋內，再取用1顆，盡快將剩下的藥粒倒回原瓶。瓶子開封後在正確的儲存條件下可放至瓶身外標示之保存期限。但當白色藥物顆粒變黃，則藥物可能已變質失效，請回診告訴醫師。
3. 本藥需存放在陰涼、乾燥的環境下保存。

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫院

表單編碼：HA-2-0007(2) 101/1/5修訂



# Nitrostat

## 耐絞寧錠

### 用藥指導



院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊  
有任何疑問時請電  
(07)615-0011轉2000  
藥劑部 關心您



學名：Nitroglycerin 0.6mg/tab

商品名：Nitrostat

藥品外觀：白色圓扁形錠劑，棕色玻璃瓶裝



## 用途

改善心臟的血氧供應量，可用於預防或緩解胸痛(心絞痛)

## 用法

- 1.胸痛發作時，先坐下再準備服用藥物。
- 2.將藥錠放於舌下待其慢慢溶解，通常有灼熱感，注意不要咀嚼或整粒吞服。
- 3.藥效約2分鐘出現，若舌下含藥5分鐘後，胸痛沒有緩解或持續惡化了，顯示病情緊急，必須儘快送醫(建議打119叫救護車)

；在抵達醫院前，可每5分鐘含1粒舌下錠，總服用顆粒數不可超過3粒。

## 可能引起的副作用

- 1.服用後暫時性頭痛可能會立即發生。
- 2.暈眩、虛弱、心跳過快及起立性低血壓等情況，偶爾會發生。

## 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：

- 1.過敏反應：如蕁麻疹、搔癢、臉部手部浮腫、口腔、喉嚨紅、腫、刺痛、胸悶、呼吸困難。
- 2.嘴唇或指甲發青。
- 3.視力模糊、口乾。
- 4.嚴重或持續性眩暈、頭重腳輕或昏倒
- 5.心跳變慢、頭痛加重。
- 6.心悸、嚴重或持續性頭痛。
- 7.心智混亂。