



保存方法：

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得處。

Prednisolone 樂爾爽錠

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊
有任何疑問時請電
(07)6150011轉2000或2120
藥劑部 關心您



成份名：Prednisolone

商品名：Donison 5mg/tab

中文名：樂爾爽錠

藥品外觀：



適應症：主要為抗發炎以及免疫抑制劑

用法：一天口服一次

可能引起的副作用：

胃部不適、體重上升、失眠、高血糖、高血壓、骨質疏鬆。

如果忘記了怎麼辦？

1. 若忘記服藥，應儘快補服忘記的劑量；但若很接近下次服藥時間，則不必補服忘記的劑量。
2. 若忘記服藥次數超過一次劑量時，請與醫師聯絡。

注意事項：

1. 若無醫師指示，不可任意停藥或自行增、減藥物劑量。
2. 服藥期間如發生發燒、胃痛厲害、大便中有血絲等症狀應告知醫師。
3. 服藥期間如需另外服用止痛劑或抗凝血劑或其他藥物請告知醫師。
4. 此藥物為免疫抑制劑，易使感染機率增加，服藥期間應避免出入公共場所、與具傳染病的人接觸，且保持良好衛生習慣。
5. 服用此藥時若感覺胃腸不適，可和食物一起併服。