



CORRELATE



注意事項

此藥作用時間快速且短暫，因此應遵守“用餐就服藥、沒用餐就不服藥”的原則，正確服藥時間為給藥後立即用餐。

保存方式

- 1.藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
- 2.請將藥品存放於兒童不易取得處。

非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售
著作權人：義大醫院



CORRELATE

Novonorm

諾和隆錠

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000或2120

藥劑部 關心您



學名：Repaglinide

商品名：NovoNorm 1 mg/tab

中文名：諾和隆錠

藥品外觀：



用途

用於第 2 型糖尿病(Type 2 DM)無法經由飲食控制、減重及加強運動等方法達成良好控制者。



用法

此藥吸收良好，服藥後 30-60 分鐘達最高血中濃度，故建議可於飯前立即服用或飯前 15-30 分鐘服用，服用後即可用餐。

可能引起的副作用

若您出現下列低血糖症狀：如極度饑餓感、焦慮、心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、頭昏眼花、頭痛等，請參照醫護人員對您的建議作處置（立即食用含糖飲料或方糖等物品，勿使用代糖）。若症狀未較改善甚至加劇時，則應在旁人陪同下回診就醫。