



保存方法：

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得處。

Sirolimus 斥消靈錠

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊
有任何疑問時請電
(07)6150011轉2000或2120
藥劑部 關心您



成份名：Sirolimus

商品名：Rapamune 1mg/tab

中文名：斥消靈錠

藥品外觀：



用途：預防器官移植之排斥

用法：通常每天口服一次

可能引起的副作用：

高血壓、周邊水腫、貧血、關節痛、血脂肪升高。

如果忘記了怎麼辦？

1. 若忘記服藥，應儘快補服忘記的劑量；但若很接近下次服藥時間，則不必補服忘記的劑量。
2. 如果忘記服藥次數超過一次劑量時，請與醫師聯絡。

注意事項：

1. 斥消靈與環孢靈併用時需間隔 4 小時。
2. 此藥必須整粒吞服，不建議剝半或咀嚼服用。
3. 食物會降低藥物的吸收所以建議空腹服用。
4. 服藥期間請勿食用葡萄柚(汁)、蘋果汁或柚子。
5. 懷孕及哺乳婦女應避免使用。
6. 定期監測並紀錄血中膽固醇及三酸甘油脂。
7. 必須長期服用，若無醫師指示，不可任意停藥或擅自增、減劑量。
8. 為免疫抑制劑，易使感染機率增加，服藥期間應避免與具傳染病的人接觸，並保持良好衛生習慣。

