

# Sofosbuvir

主成分	含量	商品名	中文商品名
Sofosbuvir	400 mg/tab.	Sovaldi	索華迪膜衣錠

## 作用：

Sofosbuvir 與其他藥物併用可以治療成人慢性 C 型肝炎基因型 1、2、3 或 4，是一種屬於核苷酸類似物的 HCV NS5B 聚合酶抑制劑。

## 劑量與用法：

一天一顆，可隨餐或不隨餐使用，療程依病情分為 12 或 24 週。

不建議單獨使用，常併用 Ribavirin 或 Ribavirin 加 Peginterferon alfa。

## 注意事項：

1. 若有腎臟、肝臟或心臟疾病等請告知醫師。輕至中度腎功能不全者無須調整劑量，無重度或接受透析者相關研究。輕度、中度、重度肝功能不全者不需調整劑量，但無肝移植者相關研究。
2. 因併用 Ribavirin，禁止用在孕婦或男性患者其伴侶有身孕，且直到療程結束後半年都須避孕。本品哺餵母乳時的風險未知，但因併用 Ribavirin，故使用時應評估利益與風險。
3. 若有使用其他藥物（例如：抗心律不整、抗癲癇、抗結核等），請告知醫生。
4. 請勿自行停藥或更改藥量，若併用藥物停藥 Sofosbuvir 也需停藥，有疑問或不適如心搏過緩等，請聯絡醫生或藥師進行評估。

## 忘記服藥時的處理方式：

若忘記服藥且距離原本應服藥之時間大於 12 小時，應儘速服用。但若已小於 12 小時則不要補服，等下次服藥時間再開始按時服藥即可，千萬不可服用雙倍劑量。

## 副作用：

常見副作用有疲累、頭痛、噁心、失眠、搔癢、腹瀉或易怒等。

## 保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境。

資料來源：藥品仿單