



8. 注意發燒寒顫等情形應立即就醫。
9. 當您有在服用其他藥物請告知醫師。
10. 服藥期間避免飲酒。

保存方法：

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放高溫或潮溼處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得處。

Tacrolimus

普樂可復膠囊

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單載法詳載所有藥物資訊
有任何疑問請電
(07)8150011轉2000或2120
藥劑部 關心您



學名：Tacrolimus

商品名：Prograf

中文名：普樂可復膠囊

藥品外觀：



用途：預防器官移植之排斥

用法：通常每 12 小時服用一次

可能引起的副作用：

可能引起腎功能異常、肝功能異常、高血壓、高血糖、胃腸不適、失眠、高血鉀、高血脂、震顫、頭痛及增加感染的情形。

如果忘記吃藥了怎麼辦？

1. 如果忘記服藥，當記起時儘快補服，如已接近下一次服藥的時間，則服用下一劑即可。
2. 如果忘記服藥次數超過一次劑量時，請與醫師聯絡。

注意事項：

1. Tacrolimus 會影響免疫力，易引起感染。若出現感染症狀，應立即告知醫師或藥師。
2. 勿自行注射疫苗。
3. 按時回診並確實遵照醫囑服藥，切勿擅自增減藥量或停藥。
4. 若有高血壓、高血糖，每日定時測量血壓、脈搏、血糖並列入記錄，於就診時提供醫師參考。
5. 懷孕、正授乳中、藥物食物過敏記錄、服藥後的反應或身體相關事項，應主動告知醫師以利治療參考。
6. 勿將藥品給予他人使用。
7. 不可和葡萄柚汁及柚子併服。