

Viekirax

主成分	含量	商品名	中文商品名
Ombitasvir	12.5 mg/tab.	Viekirax	維建樂膜衣錠
Paritaprevir	75 mg/tab.		
Ritonavir	50 mg/tab.		

作用：

Ombitasvir 是 HCV NS5A 抑制劑；Paritaprevir 為 HCV NS3/4A 蛋白酶抑制劑，兩者對於病毒複製非常重要；Ritonavir 則會增加 Paritaprevir 的曝露量，加強其抗病毒效果。此藥適用於與 Dasabuvir 或 Ribavirin 併用，以治療成人慢性 C 型肝炎基因型 1、4 之感染。

劑量與用法：

每天一次，一次兩顆，隨餐或飯後服用以增加吸收，療程依病情分為 12 或 24 週。

注意事項：

1. 不建議作為單一治療藥物，可能產生肝毒性，應於起始治療前四週以及展開治療後於臨床上有需要時監測 ALT、AST 及總膽紅素，直到療程結束。
2. 目前用於懷孕女性的資料相當有限，不建議在懷孕期間使用，且需採取有效的避孕措施。於動物試驗中會分泌進乳汁，故建議病人切勿哺餵母乳。
如與 Ribavirin 併用時，女性病患與男性病患的女性伴侶必須嚴格謹慎避免懷孕，治療期間以及結束後 6 個月內須採用有效的避孕方式。
3. 本品之排除牽涉酵素 CYP3C4，故相關藥物的使用(如 Amiodarone, Atorvastatin, 抗癲癇藥物等)需小心且禁食用葡萄柚汁。
4. 若有使用其他藥物 (例如：抗凝血劑或含雌激素的避孕藥等)，請告知醫生。
5. 勿自行停藥或更改藥量，若有疑問或不適 (例如:疲累、虛弱、食慾不振、皮膚或眼部發黃、糞便顏色改變、意識混淆等)，請盡速聯絡醫生或藥師進行評估。

忘記服藥時的處理方式：

如距離原本應服藥之時間未滿 12 小時，應儘速隨餐服用忘記的劑量；若超過 12 小時則不要補服，等下次服藥時間再開始按時服藥即可，千萬不可服用雙倍劑量。

副作用：

疲倦、噁心、發癢、皮膚反應 (發紅或皮疹)、睡眠問題。

保存方式：

請置於原始包裝中，避光貯存在 30°C 以下的環境。

資料來源：仿單