

注意事項

1. 請遵照醫師指示使用，最好全家人(尤其是配偶)同時治療。
2. 為避免再次感染，病患最近穿用過的所有衣物、被單、枕頭套和毛巾都要用很熱的水清洗或乾洗。
3. 本藥限外用，避免接觸到眼睛及黏膜，且應放置於孩童伸手不及處。
4. 若病情持續惡化時，建議應予以停藥並與醫師連絡。
5. 本藥不可使用於有急性發炎的皮膚、開放性或有滲出液之傷口。
6. 對本品有過敏反應(如：發疹、蕁麻疹等)病史者，請事先告訴醫師。

本著作非經製作全人同意，不得轉載、翻印或轉售
著作權人：義大醫院

第二版 100/6/1 修訂



B.B. lotion

利蝨洗液

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)615-0011轉分機2000或2120

藥劑部 關心您



學名：Benzyl benzoate

商品名/規格：B.B. lotion 25%, 100ml/bot

用途：治療疥癬、蝨感染



用法

局部使用（外用）

1. 疥癬：

使用前先搖勻，沐浴並擦乾後，將本藥塗於全身（從頸部到腳底），待藥品乾後再穿上衣服，24 小時後以溫水及肥皂徹底清洗乾淨，隔天再以同樣的方式使用，除非醫師特別指示，一般建議用藥為 3 天。

2. 蝨感染：

使用前先搖勻，將頭髮洗淨擦乾後，再將本藥（約 10 ml）少量徐徐倒在手上，充分搓揉頭髮和頭皮上約 3-4 分鐘後，以水沖洗乾淨。將頭髮擦乾後，再以細齒髮梳徹底刷除毛髮上之蝨卵或蝨屑。

可能引起的副作用

1. 皮膚可能會有輕微刺激反應，若症狀持續或加重，請告知醫師。
2. 疥瘡病人在治療後，搔癢症狀可能會持續達 2 週，此為正常現象，並非治療失敗。