

注意事項

- 1.使用貼片時，需確實記錄貼上及撕下的時間，使用過的貼片應對摺後放回原包裝，下次回診時連同記錄表和使用過的貼片，一併交回藥局。
- 2.請確實遵照醫師指示使用藥品，切勿自行加減藥量。
- 3.使用藥物期間請勿喝酒。
- 4.使用本貼片可能引起嗜睡，應避免開車或操作機械。

保存方法

- 1.保存在乾燥室溫下，且放在兒童拿不到的地方。
- 2.使用過的及未使用過剩下的貼片，應退還原藥局。

Durogesic TTS 25 μ g/h
Durogesic TTS 50 μ g/h

吩坦尼穿皮貼片劑

用藥指導



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法詳載所有藥物資訊
有任何疑問時請電
(07)6150011轉2000或2120
藥劑部 關心您



學名：Fentanyl

商品名：Fentanyl HPQ transdermal patch 25 $\mu\text{g/h}$;

Durogesic transdermal patch 50 $\mu\text{g/h}$

藥品外觀：



用途

芬坦尼穿皮貼片劑用來解除癌症及其他疾病引起的疼痛，可能還有其他用途，請詢問醫師或藥師以獲得更多資訊。



用法

1. 依醫師指示貼在適合部位，此部位需為無毛髮、無傷口或無放射線治療的平整皮膚表面。
2. 若無法避免有體毛的部位請剪去(不可用刮或剃)。
3. 將貼片貼上，以手掌緊壓 30 秒，確保皮膚與貼片完全貼緊。使用後用清水洗手(勿用肥皂)。
4. 每 2~3 天換片一次(依醫師指示)，請每次貼換不同部位。

可能引起的副作用

呼吸若有不順暢、心跳異常、起皮疹、視力模糊、暈眩等不舒服狀況，請告知醫師。