


口頰溶片-病患使用說明

請您務必讀過、瞭解且遵守下述病患使用說明，以便您能正確使用 PAINKYL。若您對如何正確使用 PAINKYL 有任何問題，請詢問您的醫療照護提供者或藥師。

PAINKYL 乃以一鋁箔包的型式提供。除非已預備服使用，否則請勿打開包裝。一旦打開，請立即將整片 PAINKYL 貼片用畢。

打開 PAINKYL 包裝的方法：




1. 將鋁箔包的背面朝向您，以剪刀沿箭頭方向剪開（見圖 A）。
2. 重複上述步驟剪開包裝另一側。
3. 將鋁箔包的兩層剝開，取出 PAINKYL 貼片（見圖 B）。



- 請勿咀嚼或吞下 PAINKYL。若發生上述情形，您的突發性癌疼痛可能會獲得較差的緩解效果。
- 請勿切割或撕裂 PAINKYL 貼片。

PAINKYL 的正確使用方式

1. 用舌頭潤濕您的臉頰內壁或（若需要）以清水漱口，潤濕您口中欲放上 PAINKYL 的部位。
2. 將 PAINKYL 貼片置於一清潔、乾燥的手指近指尖處，粉紅面朝上（見圖 C）。
3. 將 PAINKYL 貼片小心地置放到您的口腔中，粉紅面貼附您已潤濕的臉頰內壁（見圖 D）。
4. 用手指將 PAINKYL 貼片壓向您的臉頰，固定貼片 5 秒。
5. 將您的手指從 PAINKYL 貼片上移開，貼片將黏附於您的臉頰內壁。
6. 將貼片黏附於黏貼位置，直到貼片溶散（通常在您敷上貼片後 15 到 30 分鐘內）。
 - 五分鐘後，您即可飲用液體。
 - 若您的醫療照護提供者指示您同時使用超過一片的 PAINKYL 貼片治療您的突發性癌疼痛，請勿將貼片疊放。PAINKYL 貼片可置放於您口腔的任意一側。
 - 等待貼片溶散時，避免觸碰或移動貼片。
 - 貼片溶散前，請勿食用任何食物。



若您無法依照上述方式使用 PAINKYL，
請與您的醫療照護提供者討論治療您突發性
癌疼痛的其他選項。