

大腸鏡檢查


清腸劑準備



大腸鏡檢查

腸鏡檢查用清腸劑

1. 耐福力散



2. 富利瀉內服液




3. 保可淨



耐福力散

下午檢查



凌晨12:00

禁食



4:30



2個小時內緩慢喝完
分8次喝

加入2000c.c開水

6:30

7:00

9:00

檢查當天



2個小時內緩慢喝完
分8次喝

加入2000c.c水




大腸鏡檢查

早上檢查

耐福力散

早上檢查



凌晨12:00

4:30

6:30

檢查當天

禁食



2個小時內緩慢喝完
分8次喝

加入**2000c.c**水




大腸鏡檢查

如何取得 **2000 c.c.** 的水?

可至**超商購買**2000 c.c.的瓶裝水
或家裡可盛裝2000 c.c.的容器



2000
CC



富利瀉內服液



前1天晚上7點



晚上12點

禁食



早上4點


檢查當天



陸續補充水份量總量達
1500c.c.(分6-8次喝)



加入**240c.c.**
水或無渣飲料



陸續補充水份量總量達
1500c.c.(分6-8次喝)

加入**240c.c.**
水或無渣飲料

註：下午檢查者，第2瓶服藥時間可延至當天早上7點服用

保可淨

前1天

當天



晚上5點



晚上12點



凌晨4點

檢查

保可淨
Bowlclean®
Powder For Oral Solution
In Sachet



1包保可淨

+



150 CC 水

陸續補充水份總量達
1500-2000c.c.
(分6-8次喝)

禁食

保可淨
Bowlclean®
Powder For Oral Solution
In Sachet



1包保可淨

+



150 CC 水



大腸鏡檢查

攪拌約5分鐘
呈微溫狀後喝下

陸續補充水份總量達
750c.c. (分3次喝)

註：健診中心民眾的檢查時間皆為早上

低渣飲食

較不易產生糞便

檢查前3日開始



白稀飯



白吐司



白饅頭



海綿蛋糕



麵條



蒸蛋



去皮魚肉



喝完保可淨後都還沒排便怎麼辦？

A：

- (1) 此藥作用較為溫和緩慢，約服用後2~3小時才會開始作用
- (2) 可持續**多補充水分**，至少2000C.C以上。
- (3) 多**走動**或**按摩腹部**，以加速腸道蠕動及排便。

牛奶不是液體嗎？為什麼護士說不能喝？

A：

牛奶含**大量的乳糖**，當未消化的乳糖進入腸道，提供細菌良好的培養基，使其大量繁殖，進而形成糞便實體，所以牛奶屬於高渣食物。